



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

21.10.2020

№ 1324

Саранск

О внесении изменений в приложение к Алгоритму организации амбулаторной медицинской помощи (на дому) пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), утвержденному приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 6 октября 2020 г. № 1263 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 23 апреля 2020 года № 488 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)/подозрением в амбулаторных условиях (на дому)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приложение к Алгоритму организации амбулаторной медицинской помощи (на дому) пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), утвержденному приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 6 октября 2020 г. № 1263 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 23 апреля 2020 года № 488 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)/подозрением в амбулаторных условиях (на дому)», внести следующие изменения:

1) в Схеме лечения взрослых пациентов с ОРВИ, COVID-19 и пневмонией в амбулаторных условиях (на дому)² позицию:

« Клинический COVID-19 (миалгия, сухой кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния на фоне повышения температуры тела), COVID-19 лабораторно-подтвержденный,	Легкая	Лихорадка t< 38,0°C ЧДД<22/мин Кашель Насморк Катаральные явления	Противовирусная терапия: Схема № 1 Гидроксихлорохин* 400 мг в первый день (200 мг 2 раза/сут.), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 раза/сут.), в течение 6-8 дней * возможно в комбинации с ИФН-α Схема № 2 Рекомбинантный ИФН-α
--	--------	---	---

ковидная пневмония			<p>капли или спрей по 3 капли или 3 дозы (3000 МЕ) в каждый носовой ход 5 раз/сут. в течение 5 дней +</p> <p>Умифеновир по 200 мг 4 раза/сут. в течение 5-7 дней</p> <p>Жаропонижающая терапия: Парацетамол 500 мг при повышении температуры тела</p> <p>»</p>
---------------------------	--	--	---

заменить позицией:

«	<p>Клинический COVID-19 (миалгия, сухой кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния на фоне повышения температуры тела), COVID-19 лабораторно-подтвержденный, ковидная пневмония</p>	Легкая	<p>Лихорадка $t < 38,0^{\circ}\text{C}$ ЧДД $< 22/\text{мин}$</p> <p>Кашель Насморк Катаральные явления</p>	<p>Противовирусная терапия: Схема № 1 Фавипиравир: Пациенты с массой тела $< 75 \text{ кг}$: по 1600 мг (8 таб.) 2 раза/сут. в 1-й день и далее по 600 мг (3 таб.) 2 раза/сут. 2-10-й дни. Пациенты с массой тела $> 75 \text{ кг}$: по 1800 мг (9 таб.) 2 раза/сут. в 1-й день и далее по 800 мг (4 таб.) 2 раза/сут. 2-10-й дни.</p> <p>Схема № 2 Гидроксихлорохин* 400 мг в первый день (200 мг 2 раза/сут.), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 раза/сут.), в течение 6-8 дней * возможно в комбинации с ИФН-α</p> <p>Схема № 3 Рекомбинантный ИФН-α капли или спрей по 3 капли или 3 дозы (3000 МЕ) в каждый носовой ход 5 раз/сут. в течение 5 дней +</p> <p>Умифеновир по 200 мг 4 раза/сут. в течение 5-7 дней</p> <p>Жаропонижающая терапия: Парацетамол 500 мг при повышении температуры тела</p> <p>».</p>
---	---	--------	---	---

2) сноска 2 «2. Схема лечения взрослых пациентов с ОРВИ, COVID-19 и пневмонией действует на период действия Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)», утвержденных Минздравом России (версия 8 от 3 сентября 2020 г.).» изложить в следующей редакции:

«2. Схема лечения взрослых пациентов с ОРВИ, COVID-19 и пневмонией действует на период действия Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Минздравом России (версия 8.1 от 1 октября 2020 г.).».

Министр



О.В. Маркин